

PERIRADIKULÁRNA TERAPIA (PRT), FACETOVÁ BLOKÁDA (FB)

Klinické indikácie:

1. Pseudoradikulárny syndróm (facetový sy.)
2. LIS
3. Kombinácia oboch.

→ úspech metódy do značnej miery závisí od výberu vhodného Pt.!

CT nálezy vhodné k PRT:

1. Protrúzia platničky.
2. Hernia bez väčšej kraniokaudálnej propagácie.
3. Stenóza spinálneho kanálu.
4. Zúženie intervertebrálnych forámin.
5. Pooperačná fibróza.

CT nález vhodný k FB:

1. Intervertebrálna spondylarthróza.

☹ **Absolútna kontraindikácia: !!!**

1. Sy. kaudy.
2. Gravidita.
3. Kardialna dekompenzácia.
4. Hemoragická diatéza.
5. Ťažký celkový stav Pt.
6. Nespolupracujúci Pt.
7. Kontraindikácie podania Marcainu:
 - bradyarytmia !
 - AV blokáda so sklonom k hypotenzii.
8. Kontraindikácie podania kortikoidu:
 - vredová choroba,
 - ťažká osteoporóza,
 - infekcia,
 - st. p. ochrannom očkovaní,
 - herpes simplex a zoster.

☺ **Relatívna kontraindikácia:**

- akútne infekčné ochorenie,
- polyvalentná alergia,
- menses: fertilné ženy tesne pred, počas a po menses (10 dní celkove),
- ťažká svalová paréza,
- ťažká neurasténia.