

Pitie kontrastnej látky, ako príprava pred **CT** vyšetrením brucha.
(návod pre pacienta)

- Ampulku v ruke otočte tak, aby značka na hrdle smerovala k Vám.
- Obaľte ampulku obrúskom (kusom látky) a tlakom na hlavičku ju odlomte.
- Obsah ampulky vylejte do 1 litra tekutiny (voda, čaj). Premiešajte.
- **0,5 litra** takto pripraveného roztoku vypijte **12 hodín pred plánovaným vyšetrením** a **druhú polovicu** vypijte **1 hodinu pred vyšetrením**.

Pitie kontrastnej látky, ako príprava pred **CT** vyšetrením brucha.
(návod pre pacienta)

- Ampulku v ruke otočte tak, aby značka na hrdle smerovala k Vám.
- Obaľte ampulku obrúskom (kusom látky) a tlakom na hlavičku ju odlomte.
- Obsah ampulky vylejte do 1 litra tekutiny (voda, čaj). Premiešajte.
- **0,5 litra** takto pripraveného roztoku vypijte **12 hodín pred plánovaným vyšetrením** a **druhú polovicu** vypijte **1 hodinu pred vyšetrením**.

Pitie kontrastnej látky, ako príprava pred **CT** vyšetrením brucha.
(návod pre pacienta)

- Ampulku v ruke otočte tak, aby značka na hrdle smerovala k Vám.
- Obaľte ampulku obrúskom (kusom látky) a tlakom na hlavičku ju odlomte.
- Obsah ampulky vylejte do 1 litra tekutiny (voda, čaj). Premiešajte.
- **0,5 litra** takto pripraveného roztoku vypijte **12 hodín pred plánovaným vyšetrením** a **druhú polovicu** vypijte **1 hodinu pred vyšetrením**.